Click Here

Vendido y entregado por: Chedraui Comparamed Usar Candiphen-V crema cuando se presenten algunos de los siguientes síntomas: comezón, ardor o irritación, flujo blanco o amarillento, molestias al orinar, inflamación y coito doloroso. Candiphen-V es un antimicótico de amplio espectro para infecciones vaginales por hongos y levaduras provocadas por la presencia de Candida o balanitis por Candida (levadura). ©2025 Comparamed. Todos los derechos reservados. Aviso de Privacidad. Polska, Türkiye, España, Italia, Deutschland, Česko, Portugal, México, Chile, Brasil, Argentina, Perú, Colombia www.doctoralia.com.mx © 2025 - Encuentra tu especialista y pide cita Denominación genérica: Clotrimazol.Forma farmacéutica y formulación: Ovulos. Cada óvulo contiene: clotrimazol 100 mg. Excipiente cbp 1 óvulo.Indicaciones terapéuticas: CANDIPHEN-V Ovulos es un antimicótico de amplio espectro para infecciones vulvovaginales por hongos y levaduras (especialmente Candida albicans), Candida glabrata; Trichomonas vaginalis, colpitis por levaduras y/o trichomonas. En el caso de CANDIPHEN-V Crema puede emplearse también en pacientes con balanitis por Candida.En vaginitis que cursan con resequedad se recomienda preferentemente Ia administración de óvulos o crema, así como para aliviar la comezón, ardor o irritación de genitales externos (vulva) asociados con infección vaginal.Farmacocinética y farmacodinamia: Bajo adecuadas condiciones de prueba, las concentraciones inhibitorias mínimas (CIM) para dermatofitos, levaduras y mohos se encuentran en niveles de 0.0642-4 mg/l. El tipo de acción es primariamente fungistático, aunque en dermatofitos y Candida sppaparecen efectos fungicidas a partir de concentraciones mayores de 10-20 mg/l. CANDIPHEN-V, in vitro, además muestra propiedades antibacterianas contra cocos grampositivos y corinebacterias con valores de CIM entre 0.5-10 mg/l y a 100 mg/l tiene efecto tricomonicida. Las investigaciones con CANDIPHEN-V marcado radiactivamente con C14, administrado como comprimido vaginal de 100 mg dio una absorción vaginal entre 3 y 10% de la dosis administrada. La concentración del principio activo no modificado en el plasma, después de administración vaginal del comprimido de 100 ó 500 mg, así como de la crema vaginal a 2%, siempre se encontró por debajo del límite de comprobación. El clotrimazol se metaboliza en el hígado y se excreta una pequeña porción por vía biliar. Debido a la escasa absorción vaginal de CANDIPHEN-V en cualquiera de sus formas, no debe considerarse un efecto sistémico. Las concentraciones de clotrimazol en la vagina permanecen hasta 3 días después de Ia aplicación.Contraindicaciones: Salvo una posible hipersensibilidad al clotrimazol, no existen contraindicaciones.Precauciones generales: Pudiera presentarse desarrollo de irritación y/o sensibilización, por lo que en estos casos se deberá suspender el tratamiento y aplicar las medidas correctivas necesarias.Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia: CANDIPHEN-V en todas sus formas puede aplicarse durante el embarazo y la lactancia. En el embarazo, deberá emplearse preferentemente los comprimidos vaginales, ya sea de 100 o 500 mg, sin el aplicador. Los exámenes experimentales y clínicos no dan ningún indicio de que con la aplicación de CANDIPHEN-V durante el embarazo pueden esperarse efectos dañinos para la madre o el infante. Sin embargo, durante el primer trimestre del embarazo, como todos los medicamentos, el uso de CANDIPHEN-V queda bajo responsabilidad del médico tratante.Reacciones secundarias y adversas: Pueden llegar a presentarse ligeras manifestaciones de irritación local.Interacciones medicamentosas y de otro género: No se han reportado interacciones con medicamentos. CANDIPHEN-V en cualquiera de sus presentaciones puede reducir la efectividad y seguridad de los productos de látex (por ejemplo, condones y diafragmas) y espermaticidas vaginales, sin embargo, este efecto es temporal y se presenta sólo durante el tratamiento.Alteraciones en los resultados de pruebas de laboratorio: No se han reportado hasta la fecha.Precauciones en relación con efectos de carcinogénesis, mutagénesis, teratogénesis y sobre la fertilidad: No se han reportado hasta la fecha.Dosis y vía de administración: Vaginal. Un óvulo vaginal diario, durante tres días consecutivos, preferentemente al acostarse. Instrucciones para su administración:para todas las formas farmacéuticas de CANDIPHEN-Vaginal véase instructivo específico para cada presentación anexo en el empaque. Las formas farmacéuticas vaginales de CANDIPHEN deben introducirse lo más profundamente posible en la vagina, de preferencia estando la paciente en decúbito dorsal y con las piernas ligeramente flexionadas. Se recomienda efectuar su aplicación de preferencia por la noche, al acostarse. Para garantizar la eficacia se recomienda:efectuar el tratamiento durante los días sin menstruación. En los casos de balanitis del cónyuge, que éste se aplique CANDIPHEN Crema durante 2 semanas. Efectuar el tratamiento sin intercurso de vida sexual activa.Manifestaciones y manejo de la sobredosificación o ingesta accidental: No se han registrado hasta la fecha casos de sobredosificación o ingesta accidental.Presentación(es): Venta al público y exportación: caja con 3 ó 6 óvulos de 100 mg. Genérico intercambiable para venta al público y exportación: caja con 3 ó 6 óvulos de 100 mg. Caja con 3 óvulos de 200 mg. Farmacias similares: caja con 3 óvulos de 200 mg.Recomendaciones sobre almacenamiento: Consérvese a temperatura ambiente, a no más de 30°C y en lugar seco.Leyendas de protección: No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para el médico.Nombre y domicilio del laboratorio: Hecho en México por: LABORATORIOS QUIMICA SON'S, S.A. de C.V. Boulevard de los Reyes No. 6217, Junta Auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo, San Andrés Cholula, Puebla, C.P. 72820.Número de registro del medicamento: 111M2004 SSA, VIClave de IPPA: No. de solicitud: 093300CT050339. Este es un listado de algunos de los medicamentos, fármacos relacionados con CANDIPHEN-V OVULOS . Nombre local: CANDIPHEN-V ÓVULO 500 mg País: México Laboratorio: LABORATORIOS QUÍMICA SON´S, S.A. de C.V. Registro sanitario: 111M2004 SSA Vía: vaginal Forma: óvulo ATC: Clotrimazol ginecología (G01AF02) Embarazo: Precaución lactancia: precaución Sistema genitourinario y hormonas sexuales > Antiinfecciosos y antisépticos ginecológicos > Antiinfecciosos y antisépticos, excl. asociaciones con corticosteroides > Derivados del imidazol Impide el crecimiento de hongos actuando a nivel de la síntesis del ergosterol. La inhibición de la síntesis del ergosterol provoca la alteración estructural y funcional de la membrana citoplasmática, dando lugar a un cambio en la permeabilidad de la membrana que finalmente provoca la lisis celular. Antifúngico de amplio espectro, con actividad in vitro e in vivo, frente a dermatofitos, levaduras y mohos. Indicaciones terapéuticasClotrimazol ginecología Tto. de la candidiasis vulvovaginal no complicada. PosologíaClotrimazol ginecología Vaginal. Ads. y adolescentes > 12 años: Crema vaginal: 1%:aplicar la crema vaginal contenida en el aplicador directamente con el aplicador preferentemente por la noche antes de acostarse. 2%: aplicar una carga del aplicador intravaginal (5 g aprox.), una vez al día durante 3 días consecutivos. Comprimido/cápsula vaginal: 500 mg, dosis única ó 100 mg durante 6 días consecutivos, en ambos casos antes de acostarse. Modo de administraciónClotrimazol ginecología Vía vaginal. No usar tampones, duchas intravaginales, espermicidas u otros productos vaginales mientras se utilice. No se recomienda iniciar el tratamiento durante la menstruación. El tratamiento debe haber finalizado antes del inicio de la menstruación. Tanto la crema como comprimido vaginal debe ser introducida profundamente en la vagina, estando la paciente acostada de espaldas y con las piernas ligeramente dobladas. ContraindicacionesClotrimazol ginecología Hipersensibilidad a clotrimazol, a cualquier otro antimicótico del grupo de los imidazoles. Advertencias y precaucionesClotrimazol ginecología Inmunoconprometidos (con diabetes mellitus, infección por VIH, SIDA, trasplantadas o en tto. con corticoides orales, suelen presentar infección complicada que no responde bien a pautas de tto. cortas; además mayor riesgo de infecciones causadas por especies de Candida no albicans. Reacciones de hipersensibilidad. Si aparece fiebre (>=38 ºC), dolor abdominal, dolor de lumbar o de espalda, secreciones vaginales acuosas abundantes, náuseas y/o hemorragias vaginales, evaluar situación clinica para descartar otras patologías. Evitar contacto con los ojos InteraccionesClotrimazol ginecología Aumenta niveles plasmáticos de: tacrolimús (oral), sirolimús. Reduce la eficacia y la seguridad de: productos con latex. EmbarazoClotrimazol ginecología Los datos disponibles sobre el uso del clotrimazol en mujeres embarazadas son limitados. Los estudios realizados en animales han mostrado que dosis elevadas de clotrimazol, por vía oral, tienen efectos nocivos sobre la reproducción. Dado que la absorción de clotrimazol por vía vaginal es limitada (3-10%), no se esperan riesgos para la madre y el niño, después del uso intravaginal de clotrimazol durante el embarazo; no obstante, evaluar el beneficio de la utilización frente a los posibles riesgos. En caso de tto. en las últimas 4-6 sem del embarazo, se recomienda no usar el aplicador introduciéndose el comprimido directamente con el dedo, previo lavado cuidadoso de las manos LactanciaClotrimazol ginecología La información farmacodinámica/toxicológica disponible en estudios en animales ha mostrado que el clotrimazol y sus metabolitos se excretan en la leche materna. Debido a que se desconoce si la administración intravaginal en humanos podría dar lugar a una absorción sistémica suficiente como para que el clotrimazol y sus metabolitos se hallen en cantidades detectables en la leche materna, no se puede descartar el riesgo para el lactante. Se debe tomar la decisión de interrumpir la lactancia o abstenerse del tratamiento, teniendo en cuenta el beneficio de la lactancia para el bebé y el beneficio del tratamiento para la madre. Reacciones adversasClotrimazol ginecología Reacciones alérgicas (síncope, hipotensión, disnea, urticaria); descamación vaginal, prurito, erupción, edema, eritema, molestias, quemazón, irritación, dolor pélvico y hemorragia vaginal; dolor abdominal. © Vidal Vademecum Fuente: El contenido de esta monografía de principio activo según la clasificación ATC, ha sido redactado teniendo en cuenta la información clínica de todos los medicamentos autorizados y comercializados en España clasificados en dicho código ATC. Para conocer con detalle la información autorizada por la AEMPS para cada medicamento, deberá consultar la correspondiente Ficha Técnica autorizada por la AEMPS. Monografías Principio Activo: 14/07/2016 Ver listado de abreviaturas Ir directamente al contenido Acción Terapéutica CANDIPHEN-V c/3 ÓVULOS 200 MG. Antimicótico de amplio espectro (Tratamiento de un solo dia), para infecciones vaginales por hongos y bacterias o levaduras provocadas por Candida o balanitis por Candida (levadura). Usar cuando se presenten: comezón, ardor o irritación; flujo blanco o amarillento, molestias al orinar, inflamación y coito doloroso. Registro Sanitario: 111M2004 SSA VI Clave SAT: 51101800 Lorem ipsum dolor sit amet Vivamus a placerat dolor. Proin ut vehicula mauris. Etiam sagittis augue ipsum. Aliquam vestibulum massa nulla, ullamcorper aliquam diam feugiat vel. Fusce porttitor ultrices ante, posuere vehicula lacus tempor eu. Sed et purus et massa mattis aliquet ac vel dolor. Pellentesque eros lectus, placerat nec finibus ac, lobortis eu risus. Donec fringilla metus ligula, sit amet fermentum ex laoreet non - Ribbed and double stitched collar and armholes - High-density fabric for vivid print clarity - Machine-wash safeSingle right rear button flap pocket - Products are proudly printed in the United States Curabitur egestas suscipit odio. Nam vitae aliquam dui in laoreet elit. In posuere augue id velit placerat, vitae porttitor leo aliquet. Aenean non ligula sed lorem eleifend aliquam. Morbi posuere faucibus viverra. Proin ullamcorper, lorem lacinia cursus finibus. Nullam at mi accumsan, fermentum turpis at, hendrerit tortor Vivamus commodo magna rutrum ipsum convallis luctus. Maecenas sollicitudin tincidunt sem at consectetur. Sed ligula elit, sodales feugiat porttitor non, commodo in ipsum. Donec vehicula orci et pharetra laoreet. Donec feugiat, nibh ac ornare hendrerit, dui augue semper felis, a finibus dui felis quis magna. Curabitur a ligula purus. Suspendisse vestibulum lorem non tellus aliquet blandit. Proin cursus sollicitudin scelerisque. Donec ultrices elit quis magna lobortis porttitor. Quisque et consectetur mauris. Sed facilisis malesuada ante eget blandit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Pellentesque rutrum mattis ex ac sagittis. Nulla convallis euismod ipsum, a mollis sapien fringilla eget. Nam dignissim ornare nisi, in bibendum nibh auctor id. Quisque dictum justo id velit dapibus, id mollis diam tincidunt. Donec luctus tincidunt ultrices. Sed condimentum ante accumsan, sagittis lorem quis, dictum enim. Nam et facilisis odio. Ut iaculis dui non interdum accumsan. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce lacus sem, molestie non convallis nec, tristique a lacus. Proin eget lacus semper dui imperdiet accumsan. Morbi sagittis erat ac justo congue, a ornare tortor mollis. Aenean eu vulputate diam. Praesent suscipit ex non elit finibus ultricies. Debes iniciar sesión para utilizar el buscador. Denominación genérica: Clotrimazol.Forma farmacéutica y formulación: Ovulos. Cada óvulo contiene: clotrimazol 100 mg. Excipiente cbp 1 óvulo.Indicaciones terapéuticas: CANDIPHEN-V Ovulos es un antimicótico de amplio espectro para infecciones vulvovaginales por hongos y levaduras (especialmente Candida albicans), Candida glabrata; Trichomonas vaginalis, colpitis por levaduras y/o trichomonas. En el caso de CANDIPHEN-V Crema puede emplearse también en pacientes con balanitis por Candida.En vaginitis que cursan con resequedad se recomienda preferentemente Ia administración de óvulos o crema, así como para aliviar la comezón, ardor o irritación de genitales externos (vulva) asociados con infección vaginal.Farmacocinética y farmacodinamia: Bajo adecuadas condiciones de prueba, las concentraciones inhibitorias mínimas (CIM) para dermatofitos, levaduras y mohos se encuentran en niveles de 0.0642-4 mg/l. El tipo de acción es primariamente fungistático, aunque en dermatofitos y Candida sppaparecen efectos fungicidas a partir de concentraciones mayores de 10-20 mg/l. CANDIPHEN-V, in vitro, además muestra propiedades antibacterianas contra cocos grampositivos y corinebacterias con valores de CIM entre 0.5-10 mg/l y a 100 mg/l tiene efecto tricomonicida. Las investigaciones con CANDIPHEN-V marcado radiactivamente con C14, administrado como comprimido vaginal de 100 mg dio una absorción vaginal entre 3 y 10% de la dosis administrada. La concentración del principio activo no modificado en el plasma, después de administración vaginal del comprimido de 100 ó 500 mg, así como de la crema vaginal a 2%, siempre se encontró por debajo del límite de comprobación. El clotrimazol se metaboliza en el hígado y se excreta una pequeña porción por vía biliar. Debido a la escasa absorción vaginal de CANDIPHEN-V en cualquiera de sus formas, no debe considerarse un efecto sistémico. Las concentraciones de clotrimazol en la vagina permanecen hasta 3 días después de Ia aplicación.Contraindicaciones: Salvo una posible hipersensibilidad al clotrimazol, no existen contraindicaciones.Precauciones generales: Pudiera presentarse desarrollo de irritación y/o sensibilización, por lo que en estos casos se deberá suspender el tratamiento y aplicar las medidas correctivas necesarias.Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia: CANDIPHEN-V en todas sus formas puede aplicarse durante el embarazo y la lactancia. En el embarazo, deberá emplearse preferentemente los comprimidos vaginales, ya sea de 100 o 500 mg, sin el aplicador. Los exámenes experimentales y clínicos no dan ningún indicio de que con la aplicación de CANDIPHEN-V durante el embarazo pueden esperarse efectos dañinos para la madre o el infante. Sin embargo, durante el primer trimestre del embarazo, como todos los medicamentos, el uso de CANDIPHEN-V queda bajo responsabilidad del médico tratante.Reacciones secundarias y adversas: Pueden llegar a presentarse ligeras manifestaciones de irritación local.Interacciones medicamentosas y de otro género: No se han reportado interacciones con medicamentos. CANDIPHEN-V en cualquiera de sus presentaciones puede reducir la efectividad y seguridad de los productos de látex (por ejemplo, condones y diafragmas) y espermaticidas vaginales, sin embargo, este efecto es temporal y se presenta sólo durante el tratamiento.Alteraciones en los resultados de pruebas de laboratorio: No se han reportado hasta la fecha.Precauciones en relación con efectos de carcinogénesis, mutagénesis, teratogénesis y sobre la fertilidad: No se han reportado hasta la fecha.Dosis y vía de administración: Vaginal. Un óvulo vaginal diario, durante tres días consecutivos, preferentemente al acostarse. Instrucciones para su administración:para todas las formas farmacéuticas de CANDIPHEN-Vaginal véase instructivo específico para cada presentación anexo en el empaque. Las formas farmacéuticas vaginales de CANDIPHEN deben introducirse lo más profundamente posible en la vagina, de preferencia estando la paciente en decúbito dorsal y con las piernas ligeramente flexionadas. Se recomienda efectuar su aplicación de preferencia por la noche, al acostarse. Para garantizar la eficacia se recomienda:efectuar el tratamiento durante los días sin menstruación. En los casos de balanitis del cónyuge, que éste se aplique CANDIPHEN Crema durante 2 semanas. Efectuar el tratamiento sin intercurso de vida sexual activa.Manifestaciones y manejo de la sobredosificación o ingesta accidental: No se han registrado hasta la fecha casos de sobredosificación o ingesta accidental.Presentación(es): Venta al público y exportación: caja con 3 ó 6 óvulos de 100 mg. Genérico intercambiable para venta al público y exportación: caja con 3 ó 6 óvulos de 100 mg. Caja con 3 óvulos de 200 mg. Farmacias similares: caja con 3 óvulos de 200 mg.Recomendaciones sobre almacenamiento: Consérvese a temperatura ambiente, a no más de 30°C y en lugar seco.Leyendas de protección: No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para el médico.Nombre y domicilio del laboratorio: Hecho en México por: LABORATORIOS QUIMICA SON'S, S.A. de C.V. Boulevard de los Reyes No. 6217, Junta Auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo, San Andrés Cholula, Puebla, C.P. 72820.Número de registro del medicamento: 111M2004 SSA, VIClave de IPPA: No. de solicitud: 093300CT050339. Este es un listado de algunos de los medicamentos, fármacos relacionados con CANDIPHEN-V OVULOS .