Click Here

# تحريض الإباضة المالية acog إرشادات

[illegible]

[illegible] بويضات متعددة. تتطلب إدارة موجهة العدد الناسلية البشرية بعد انقطاع الطمث (LH) والهرمون اللوتيني (FSH) باستخدام هذا الدواء القابل للحقن. يتم تحفيز المبيض لإنتاج بويضات متعددة أثناء دورة تحريض الإباضة. تعد المراقبة المنتظمة ضرورية لتقليل أي مضاعفات لدى المرضى الذين يظهرون استجابات متغيرة. وبالتالي، لا توجد جرعة ثابتة موصى بها، ولكن يتم تخصيص دورة المريض لمراقبة استجابة المبيض عن طريق الموجات فوق الصوتية، وكذلك اختبارات مستوى هرمون الاستروجين في الدم. اقرأ أيضًا: تتبع الإباضة مع عدم انتظام الدورة الشهرية وكيفية إجراء تبويضات مبررة الإنسان بعد انقطاع الطمث موجهة العدد الناسلية دواء الخصوبة هذا عبارة عن مزيج من الهرمون المنبه للجريب (FSH)

[illegible] الحمل أو كيف [illegible] LH الوليد، تكشف المجموعات تدفق LH البولي واختبار الدورة بالموجات فوق الصوتية. في اختبارات LH وهي [illegible] LH

[illegible] المبيضي الأمثل: يشجع على تطوير العديد من بصيلات وبويضات في الحالات التي تنتج فيها المبايض البيض ولكن ليس باعداد كافية. التوقيت المتحكم فيه للحمل: يستخدم لتحديد وقت الحمل بمثابة للأزواج الذين يخضعون لتقنيات الإنجاب المساعدة مثل التلقيح داخل الرحم (IUI) أو [illegible] أو نقنيات الإنجاب المساعدة مثل التلقيح داخل الرحم. دعم المرحلة الأصفرية: يمكن وصف الدعم الهرموني لدعم بطانة الرحم. اختبار المراقبة والحمل: إجراء اختبار الحمل بعد حوالي أسبوعين من الإباضة لتحديد ما إذا كان الحمل قد حدث. انرعاج خفيف: قد تعاني بعض النساء من انزعاج خفيف أو انتفاخ أو ألم في منطقة البطن. الراحة: استنشاق الأنسجة العادية، ولكن الراحة إذا لزم الأمر. تجنب الأنشطة القوية. الترطيب: اشرب الكثير من الماء للمساعدة في تخفيف الانتفاخ أو الانزعاج. اختيار الحمل: قومي بإجراء اختبار الحمل بعد حوالي أسبوعين من الإباضة. مواعيد المتابعة: ناقش نتائج العلاج وخطط للخطوات المستقبلية إذا لزم الأمر. الرفاه العاطفي: أفهمي أن المشاعر المختلطة طبيعية أثناء علاجات

نمات الطبية: إلتزم بعلاجك [illegible] الخصوبة. الدعم: اعتمد على شريكك أو أصدقائك أو عائلتك أو مجموعات الدعم للحصول على الدعم العاطفي. ملازمة فرط تحفير المبيض (OHSS): في بعض الحالات، يمكن أن يصبح المبيضان أكثر استجابة للأدوية، مما يؤدي إلى ملازمة فرط تحفير المبيض (OHSS). أو حالات مثل ملازمة المبيض المتعدد الكيسات (OHSS) قد تستفيد النساء اللاتي يعانين من دورات شهرية غير منتظمة، أو انقطاع الإباضة (نقص الإباضة)، أو حالات مثل ملازمة المبيض المتعدد الكيسات (OHSS) في بعض الحالات، يمكن أن يصبح المبيضان أكثر استجابة للأدوية، مما يؤدي إلى ملازمة فرط تحفير المبيض (OHSS). الخصوبة. الدعم: اعتمد على شريكك أو أصدقائك أو عائلتك أو مجموعات الدعم للحصول على الدعم العاطفي. ملازمة فرط تحفير المبيض

لحمل خلال [illegible] FSH. LH. تنبيه تظهر بصلات المبيض واختبارات الدم لقياس مستويات الهرمونات (على سبيل المثال [illegible] تشرح الدكتورة "ساندل كروفيلد" (Sandel Krofield)، محجر وصول بصلات المبيض إلى الحجم المناسب، يتم إعطاء حقنة هرمونية (حقنة تحفيزية) تحتوي هذه الحقنة على FSH. LH. [illegible] Centers for Disease Control and Prevention: 1. العمر: لا تستطيع المرأة الحمل والإنجاب بعد توقف دورتها الطمثية، والذي يحدث عادة في الأربعينات أو الخمسينات من العمر؛ إذ تولد النساء مع عدد معيّن من البويضات يتناقص كلما تقدّمن في السن، بينما ينتج الرجل النطاف ضمن الخصيتين طوال حياته. 2. وزن الحشوة يمكن أن يكون [illegible] 3. العلاقات الجنسية [illegible] نخراج بويضة أو أكثر من المبيضين وتلقيحها باستخدام النطاف في المختبر، ومن ثمّ يختار الطبيب المُضعة التي تملك فرصة نجاح أكبر، ويقوم بحقنها داخل الرحم، وعندها من المحتمل أن تعشش وبحدث الحمل. وتُحدّد المُضعات المتبقية لتُستخدم بمحاولات لاحقة في المستقبل. إقرأ أيضًا: العقم والغذاء: كيف يؤثر نظامنا الغذائي على معدل الخصوبة؟ في الختام: تتميز كل طريقة من طرائق علاج العقم بمخاطرها وفوائدها، كما تختلف كثيراً في تكلفتها وكونها باضعة أو غازية (الإجراءات الطبية الغازية هي الغدوانية التي تتطلب إحداث شقوق جراحية في الجسم أو وخزاً بالإبر). تختلف رحلة كل شريكين لتكوين عائلةٍ عن غيرهما من الشركاء؛ لذا على كل شريكين استشارة الطبيب لدراسة الخيارات المتاحة. المصدر